



**DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL DE EMBALSES  
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL EBRO**

**EMBALSE DE TALARN**

**LIMNOS**

**1996**

**EMBALSE DE TALARN****1) CARACTERÍSTICAS GENERALES**

<b>Nombre:</b>	Talarn
<b>Pki - Pkf:</b>	4.050-5.000
<b>Código cauces:</b>	
<b>Cuenca:</b>	Noguera-Pallaresa/Segre
<b>CH:</b>	Ebro
<b>Provincia:</b>	Lérida
<b>Propietario:</b>	F.E.C.S.A.
<b>Año de terminación:</b>	1916

**2) USOS Y TIPO DE PRESA**

<b>Usos:</b>	Hidroeléctrico/Riegos/Regulación
<b>Actividades:</b>	Navegación/Navegación a motor/Baños/Club náutico/Pesca
<b>Interés Natural:</b>	Aves acuáticas/Otras especies

**Comentarios:**

- El embalse de Talarn recoge las aguas de los ríos Noguera-Pallaresa y Flamisell, los cuales desembocan en la cola del embalse en el municipio de Pobla de Segur. El embalse es propiedad de F.E.C.S.A. y se dedica principalmente a la producción hidroeléctrica, así como a riegos.
- En el embalse se practica la navegación sin y con motor y existe un camping (Gasset) en la margen derecha que cuenta con embarcadero. En el embalse se permite la pesca controlada en consorcio.
- El embalse tiene interés natural por aves acuáticas y está considerado de interés nacional en el catálogo de zonas húmedas españolas de la SEO (1987). Si bien el propio embalse no está enclavado en una área natural protegida, el río Noguera-Pallaresa aguas arriba del embalse (a una distancia de unos 5 km) cuenta con un

tramo de 5 km que es reserva natural parcial (Noguera-Pallaresa Collegats). Ésta fue creada para la protección del hábitat de la nutria.

<b>Tipo de presa:</b>	Gravedad	
<b>Cota tomas (m s.n.m.):</b>	Aliviadero:	-
	Central hidroeléctrica:	458,85
	Toma de riegos:	455,05
	Desagüe de medio fondo:	480,0
<b>Torre de tomas:</b>	No existe	
<b>Escala de peces:</b>	No existe	

### Comentarios:

- El agua para la producción hidroeléctrica se deriva por una tubería que sale de la presa hasta la central eléctrica situada a pie de presa, la cual tiene una capacidad de turbinación de 20 m<sup>3</sup>/s. De la central de Talarn sale un canal que deriva parte del agua (hasta 15 m<sup>3</sup>/s) hasta la central de Gabet situada a unos 8 km de distancia. Posteriormente el agua turbinada se devuelve al río aguas arriba del embalse de Terradets. La toma hidroeléctrica está situada a unos 38 m del fondo.
- El agua para riego se deriva por dos acequias de riego por la margen derecha e izquierda, y la concesión total es de unos 2,5 m<sup>3</sup>/s.
- El embalse carece de desagües de fondo, por lo que el riesgo de vertido de aguas anóxicas es bajo.

### 3) MORFOMETRÍA-HIDROLOGÍA

<b>Volumen (hm<sup>3</sup>):</b>	205,1
<b>Superficie (ha):</b>	926,6
<b>Cota (m s.n.m.):</b>	500,9
<b>Profundidad máxima (m):</b>	81
<b>Profundidad media (m):</b>	22
<b>Profundidad termoclina (m):</b>	5-15
<b>Desarrollo de volumen:</b>	0,8
<b>Volumen epilimnion (hm<sup>3</sup>):</b>	33-45

<b>Volumen hipolimnion (hm<sup>3</sup>):</b>	80-138
<b>Relación E/H:</b>	0,3-0,4
<b>Fluctuación de nivel:</b>	Mucha
<b>Tiempo de residencia (meses):</b>	1-2

## **Comentarios:**

- La termoclina se encuentra a partir de 5 m de profundidad en pleno verano. A principios de septiembre de 1996, el embalse se encontró en proceso de mezcla con la termoclina a 42 m.
- Los volúmenes de epilimnion e hipolimnion se han calculado para la reservas mínima, media y máxima observadas en agosto en el periodo de 1959 a 1990, y con la termoclina a 5 m. La relación E/H es menor que 1 en todos los casos, lo cual reduce la probabilidad de aparición de anoxia.
- La oscilación del embalse es elevada (más 10 m) lo que favorece la erosión de las laderas. Sin embargo el perfil del embalse es encajonado ( $Dv < 1$ ) lo cual limita ese riesgo.
- El tiempo de residencia es bajo (1-2 meses), y esto limita la eutrofia del agua.

## **4) HIDROQUÍMICA**

### **Embalse**

<b>Conductividad (µS/cm):</b>	120-400
<b>Calcio (mg/L):</b>	40-98
<b>Fosfato (mg/L):</b>	0-0,12
<b>Nitrato (mg/L):</b>	0-2,26
<b>Amonio (mg/L):</b>	0-3,5

### **Comentarios:**

- El agua del embalse presenta una mineralización baja-moderada, con elevadas concentraciones de calcio.

- El contenido de nutrimento es moderado-alto, con concentraciones de amonio más elevadas en el hipolimnion.
- La elevada concentración de calcio del agua rebaja la disponibilidad del fósforo, lo cual es un factor limitante de la eutrofia.

## **Tributario principal**

<b>Conductividad (<math>\mu\text{S/cm}</math>):</b>	130-541
<b>Calcio (mg/L):</b>	51-60
<b>Fosfato (mg/L):</b>	0-0,26
<b>Nitrato (mg/L):</b>	0-4,0
<b>Amonio (mg/L):</b>	0,02-0,47

## **Comentarios:**

- El tributario principal es el río Noguera Pallaresa, cuya cuenca constituye el 75% de la cuenca del embalse. El agua es mineralizada y presenta una elevada concentración de calcio; la concentración de nutrimentos es moderada. El río Flamisell aporta un menor caudal al embalse (su cuenca sólo constituye el 17% de la cuenca del embalse), si bien las aguas son un poco más mineralizadas y tienen más nutrientes que las del río Noguera- Pallaresa. Las características físico-químicas son las siguientes: Conductividad: 360-525  $\mu\text{S/cm}$ ; calcio: 58,5 mg/L; fosfato: 0,007-2,5 mg/L; nitrato: 0-2,17 mg/L; 0,01-13,4 mg/L.
- Las aportaciones de nutrimentos por los tributarios son elevadas, según la estimación de Synconsult para el año 1990. El río Noguera Pallaresa aporta unas cargas de 63 tm/año de fósforo y 648 tm/año de nitrógeno. El río Flamisell aporta 142 tm/año de fósforo y 664 tm/año de nitrógeno.

## **5) ESTADO TRÓFICO**

<b>Nivel trófico:</b>	Mesotrófico
<b>Hipolimnion:</b>	Anóxico
<b>Blooms algales:</b>	-

## Comentarios:

- Synconsult (muestreo de 1990-91) califica a este embalse como mesotrófico, de acuerdo con varios índices tróficos. La carga total de fósforo y nitrógeno que alcanza el embalse (tributarios + escorrentía) es de 211 tm/año de fósforo y de 1.387 tm/año de nitrógeno (datos de 1990). La aplicación del modelo de Vollenweider que relaciona la carga de fósforo ( $\text{g/m}^2/\text{año}$ ) con las características morfométricas del embalse (Profundidad media/tiempo de residencia) indica que se rebasa la carga de fósforo considerada como peligrosa lo que conduce a la eutrofización de la masa de agua. Sin embargo, la alta concentración de calcio del agua y la tasa elevada de renovación del agua son factores amortiguadores de la eutrofia de este embalse.
- En el muestreo de 1996, que corresponde a un año húmedo, el embalse es oligotrófico de acuerdo con la baja concentración de clorofila ( $0,2 \text{ mg/m}^3$ ), aunque esto responde a la situación final del verano y al inicio de la mezcla vertical del agua. La transparencia del agua (DS de 4,76 m) es propia de aguas mesotróficas, según la clasificación de OCDE (1980), aunque en este caso obedece a turbiedad inorgánica y a fenómenos de dispersión de la luz en aguas carbonatadas. Las concentraciones de fosfato en los tributarios son muy bajas.
- El hipolimnion se mantiene oxigenado, aunque la concentración de oxígeno decrece en profundidad; en septiembre de 1996 se registra un valor mínimo de 1,2 mg/L en el fondo. En los 7 muestreos realizados por Synconsult entre 1989 y 1991, sólo en una ocasión se detectó anoxia a partir de 40 m de profundidad (octubre de 1990). La capa anóxica se encontró por debajo de la toma hidroeléctrica por lo que no existió riesgo de turbinación de aguas anóxicas.
- No se han descrito proliferaciones de algas en este embalse que provoquen acumulaciones y malos olores.

## 6) PECES

**Densidad:**

Media

## Especies:

*Salmo trutta* (trucha común)  
*Oncorhynchus mykiss* (trucha arco-iris)  
*Micropterus salmoides* (black-bass)  
*Cyprinus carpio* (carpa común)  
*Barbus graellsii* (barbo de Graells)  
*Barbus haasi* (barbo culirrojo)  
*Carasius auratus* (carpín)  
*Stizostedion lucioperca* (lucio)

## 7) SEDIMENTOS

<b>Nivel de aterramiento:</b>	Alto
<b>Materia orgánica:</b>	Baja
<b>Producción de metano:</b>	Baja
<b>Riesgo de contaminación:</b>	Bajo

### Comentarios:

- El aterramiento se considera alto. La pérdida de volumen del embalse desde su llenado ha sido de 69,6 hm<sup>3</sup> lo que supone un 26,9% de su capacidad inicial (Avendaño *et al.*, 1996). El aterramiento del embalse está favorecido por la ausencia de desagües de fondo que permitan desagües periódicos de agua profunda y lodos.
- Los lodos son limosos y plásticos. El riesgo de enturbiamiento del agua del tramo fluvial bajo la presa es reducido por la ausencia de desagües de fondo.

## 8) TRAMO FLUVIAL BAJO LA PRESA

<b>Anchura del cauce (m):</b>	5-8
<b>Pendiente (%):</b>	1,1
<b>Caudal de compensación (m<sup>3</sup>/s):</b>	No
<b>Estructura del lecho:</b>	Tabla/Rápido
<b>Objetivo de calidad:</b>	OC-2
<b>Usos:</b>	Pesca

## Fauna acuática

<b>Índice biótico (B.M.W.P.):</b>	84-98
<b>Índice biótico (nivel de calidad):</b>	2
<b>Calificación del tramo según peces:</b>	Ciprinícola
<b>Especies de peces:</b>	

*Salmo trutta* (trucha común)  
*Oncorhynchus mykiss* (trucha arco-iris)  
*Micropterus salmoides* (black-bass)  
*Cyprinus carpio* (carpa común)  
*Barbus graellsii* (barbo de Graells)  
*Barbus haasi* (barbo culirrojo)  
*Chondrostoma toxostoma* (madrilla)  
*Carasius auratus* (carpín)  
*Anguilla anguilla* (anguila)  
*Blenius fluviatilis* (fraile)

## Ecosistema de ribera:

- El bosque de ribera está bien desarrollado en algunas zonas. Está constituido por chopos (*Populus* sp.), y bosquetes abundantes de mimbreras (*Salix* sp.).

## Comentarios:

- El río Noguera-Pallaresa bajo la presa presenta una importante reducción de caudal ya que no recibe caudal ecológico. El agua sale por la tubería forzada hasta la central eléctrica de Talarn (capacidad de turbinación de 20 m<sup>3</sup>/s) que se encuentra a unos 500 m de la presa; de ahí el agua se deriva por un canal a la central de Gabet (capacidad de turbinación de 20 m<sup>3</sup>/s) que se encuentra a unos 8 km de la presa. El tramo comprendido entre la presa y la central de Talarn no recibe ningún caudal y puede llegar a secarse. En la central eléctrica hay la posibilidad de devolver al río una parte del agua turbinada, pero sólo en el caso de que la central de Talarn turbine más de 15 m<sup>3</sup>/s que es la capacidad de la central de Gabet. En esta última central el agua se restituye al río en el tramo aguas arriba del embalse de Terradets.

- En el tramo entre la central de Talarn y la central de Gabet el río va ganando caudal por filtraciones, aportes de barrancos y especialmente del río Conques, por lo que la calidad biológica es aceptable. El índice biológico aguas abajo de Tremp tiene valores de la clase 2 que son aguas con indicios de contaminación. Aguas abajo de la central de Gabet el río incrementa el caudal y las fluctuaciones del mismo, según el régimen de turbinados; por este motivo, se observa la presencia de charcas aisladas del cauce principal.
- Respecto a la pesca el tramo es poco accesible, aunque tanto el río como en el canal hay variedad y abundancia de peces. La trucha y la anguila son de repoblación. También se encuentra cangrejo autóctono (*Australopotamobius pallipes*) en abundancia en el canal.

## **9) RIESGOS AMBIENTALES**

### **MORTANDAD DE PECES**

Ninguna

### **AFECCIONES A LOS PECES**

1. Afecciones a los peces del embalse por pérdida de hábitat (reducción del alimento) debido a oscilaciones del nivel del agua.
2. Afecciones a los peces del tramo fluvial bajo la presa por fluctuaciones bruscas del caudal.
3. Afecciones a los peces del tramo fluvial bajo la presa por reducción o eliminación del caudal.

### **AFECCIONES A OTRA FAUNA**

1. Afecciones a la población de nutria del tramo fluvial aguas arriba del embalse por fluctuación del nivel del agua.

2. Afecciones a la población de nutria del tramo fluvial bajo la presa por fluctuaciones del caudal.
3. Afecciones a las aves acuáticas del embalse por pérdida de hábitats.

## **AFECCIONES AL ECOSISTEMA DE RIBERA**

Ninguna

## **RIESGOS HIDROLÓGICOS**

Ninguno

## **AFECCIONES A LOS USOS DEL EMBALSE Y DEL TRAMO FLUVIAL**

1. Afección a la pesca por perturbaciones a los peces del embalse (ver afecciones a los peces).
2. Afección a la pesca por perturbaciones a los peces del tramo fluvial bajo la presa (ver afecciones a los peces).
3. Afección a la pesca en el embalse por la dificultad de acceso con el nivel bajo.
4. Afección a la pesca en el tramo bajo la presa por fluctuación del caudal.

## **RIESGOS PARA LA NAVEGACIÓN**

Ninguno.

## **COMENTARIOS A LOS RIESGOS AMBIENTALES**

- Este embalse no presenta riesgos ambientales de importancia. La fluctuación del nivel puede limitar la abundancia de peces y de aves acuáticas y disminuir el interés del embalse para la pesca. La ausencia de desagües de fondo reduce el riesgo de vertidos de aguas turbias o anóxicas.

- En el tramo fluvial, la disminución del caudal en las inmediaciones de la presa limita a la comunidad de peces, aunque esto sólo afecta de forma drástica a un tramo corto del río. Aguas abajo, el caudal del río aumenta y es más estable permitiendo el aumento de la calidad biológica. Aguas abajo de la Central de Gabet, y tras la reincorporación del caudal turbinado, el tramo está sometido a fuertes variaciones del caudal, lo que limita a las poblaciones biológicas y a su uso (pesca).

## **ACTUACIONES (MEDIDAS CORRECTORAS, PROCEDIMIENTOS DE DESEMBALSE; ACTUACIONES EN SEQUÍA).**

- Mantener un caudal de compensación bajo la presa para favorecer a las comunidades biológicas.
- Control de la eutrofia: El embalse tiende a la eutrofia según Synconsult por lo que deberían mejorarse las medidas de gestión de las aguas residuales urbanas especialmente en el municipio de Pobla de Segur (la depuradora existente sólo depura el 50% de las aguas residuales del municipio).
- Actuaciones en sequía: Aunque la probabilidad de turbinar agua anóxica es baja no es imposible, por lo que se debería controlar la concentración de oxígeno disuelto,  $\text{SH}_2$  y  $\text{NH}_4$  en el agua del hipolimnion. Dejar de turbinar en las siguientes condiciones:
  - ⇒ si aparece  $\text{SH}_2$
  - ⇒ si no se asegura una concentración de oxígeno superior a 4 mg/L en el río (límite inferior aguas ciprinícolas).
  - ⇒ si la concentración de  $\text{NH}_4$  es mayor de 8 mg/L.

## **PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO**

- Medir la concentración de oxígeno disuelto en el agua de fondo en verano (principalmente a finales).
- Si se mide menos de 1 mg/L analizar también la concentración de  $\text{SH}_2$  y  $\text{NH}_4$ .

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS  
DEL EMBALSE Y TRIBUTARIO PRINCIPAL**

**EMBALSE:** **Talarn** **Fecha:** 12/9/96  
**Coordenadas UTM (presa):** 31TCG277720

---

Conductividad ( $\mu\text{s/cm}$ ) :	224	NH <sub>4</sub> superf. (mg/L) :	0
Ca (mg/L) :	-	NH <sub>4</sub> fondo (mg/L) :	0
NO <sub>3</sub> (mg/L) :	-	Clorofila (mg/m <sup>3</sup> ) :	0,2
PO <sub>4</sub> (mg/L) :	-	Disco Secchi (m) :	4,76

---

---

**Tributario principal:** 1 **Noguera Pallaresa**

---

Conductividad ( $\mu\text{s/cm}$ ) :	330	NO <sub>3</sub> (mg/L) :	0,91
Ca (mg/L) :	51,3	NH <sub>4</sub> (mg/L) :	0
		PO <sub>4</sub> (mg/L) :	0,008

---

---

**Tributario principal:** 2 **Flamigell**


---

Conductividad ( $\mu\text{s/cm}$ ) :	361	NO <sub>3</sub> (mg/L) :	2,17
Ca (mg/L) :	58,5	NH <sub>4</sub> (mg/L) :	0,05
		PO <sub>4</sub> (mg/L) :	0,007

---

---


## EMBALSE DE TALARN




Perfiles de conductividad, temperatura, turbidez y oxígeno disuelto en el agua del embalse, el día 12 de septiembre de 1996. Cota: 489,94.

# EMBALSE DE TALARN

## VOLUMEN EMBALSADO (hm3)




## FLUCTUACIÓN DEL EMBALSE (m)



# EMBALSE DE TALARN


## TIEMPO DE RESIDENCIA (meses)



EMBALSE DE TALARN



Embalse de Talarn, en septiembre de 1996.



Sedimento limoso del embalse de Talarn, extraído en las proximidades de la presa.

EMBALSE DE TALARN



Río Noguera Pallaresa, aguas abajo de la presa de Talarn.



Canal que conduce los turbinados de la central hidroeléctrica situada a pie de presa a la central de Gabet.

EMBALSE DE TALARN



Tramo del río Noguera Pallaresa entre la presa de Talarn y la central hidroeléctrica de Gabet.



Noguera Pallaresa aguas abajo de la central hidroeléctrica de Gabet y aguas arriba del embalse de Terradets.



## ADICIONAL INFORME EMBALSE DE TALARN 1996

Durante el año 2022 se han revisado los datos del embalse de Talarn recopilados durante el año 1996, en aplicación del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, a partir de la trasposición de la Directiva Marco del Agua (DMA).

La metodología utilizada ha consistido en obtener del informe de dicho año los datos necesarios para estimar de nuevo el estado trófico y el potencial ecológico y, recalcular el valor correspondiente en cada variable y en el estado final del embalse, utilizando las métricas publicadas en 2015, lo que permite comparar el estado de los embalses en un ciclo interanual de forma homogénea.

En cada apartado considerado se indica la referencia del apartado del informe original al que se refiere este trabajo adicional.

### 1. ESTADO TRÓFICO

Para evaluar el grado de eutrofización o estado trófico de una masa de agua se aplican e interpretan una serie de indicadores de amplia aceptación. En cada caso, se ha tenido en cuenta el valor de cada indicador en función de las características limnológicas básicas de los embalses. Así, se han podido interpretar las posibles incoherencias entre los diversos índices y parámetros y establecer la catalogación trófica final en función de aquellos que, en cada caso, responden a la eutrofización de las aguas.

Dentro del presente estudio se han considerado los siguientes índices y parámetros:

#### **a) Concentración de nutrientes. Fósforo total (PT)**

La concentración de fósforo total en el epilimnion del embalse es un parámetro decisivo en la eutrofización ya que suele ser el factor limitante en el crecimiento y reproducción de las poblaciones algales o producción primaria. De entre los índices conocidos, se ha adoptado en el presente estudio, el utilizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) resumido en la tabla A1, ya que es

el que mejor refleja el grado trófico real en los casos estudiados y además es el de más amplio uso a nivel mundial y en particular en la Unión Europea (UE), España y la propia Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Desde 1984 se demostró que los criterios de la OCDE, que relacionan la carga de nutrientes con las respuestas de eutrofización, eran válidos para los embalses españoles.

**Tabla A1.** Niveles de calidad según la concentración de fósforo total.

Estado Trófico	Ultraoligotrófico	Oligotrófico	Mesotrófico	Eutrófico	Hipereutrófico
Concentración PT ( $\mu\text{g P/L}$ )	0-4	4-10	10-35	35-100	>100

### b) Fitoplancton (Clorofila *a*, densidad algal)

A diferencia del anterior, el fitoplancton es un indicador de respuesta trófica y, por lo tanto, integra todas las variables causales, de modo que está influido por otros condicionantes ambientales además de estarlo por los niveles de nutrientes. Se utilizan dos parámetros como estimadores de la biomasa algal en los índices: concentración de clorofila *a* en la zona fótica ( $\mu\text{g/L}$ ) y densidad celular ( $\text{n}^\circ$  células/ml).

Al contar en este estudio mayoritariamente con sólo una campaña de muestreo, y por tanto no contar con una serie temporal que nos permitiera la detección del máximo anual, se utilizaron las clases de calidad relativas a la media anual (tabla A2). La utilización de los límites de calidad relativos a la media anual de clorofila se basó en el hecho de que los muestreos fueron realizados durante la estación de verano. Según la bibliografía limnológica general, el verano coincidiría con un descenso de la producción primaria motivado por el agotamiento de nutrientes tras el pico de producción típico de finales de primavera. Por ello, la utilización de los límites o rangos relativos al máximo anual resultaría inadecuada.

Para la densidad celular, basamos nuestros límites de estado trófico en la escala logarítmica basada en los estudios limnológicos de Margalef, ya utilizada para incluir más clases de estado trófico en otros estudios (tabla A2). Estos resultados se ajustaban de forma más aproximada a los obtenidos mediante otras métricas estándar de la OCDE como las de P total o clorofila. En el presente estudio, los índices elegidos son los siguientes:

**Tabla A2.** Niveles de calidad según la clorofila *a* y la densidad algal del fitoplancton.

Estado Trófico	Ultraoligotrófico	Oligotrófico	Mesotrófico	Eutrófico	Hipereutrófico
Clorofila <i>a</i> (µg/L)	0-1	1-2,5	2,5-8	8,0-25	>25
Densidad (cél./ml)	<100	100-1000	1000-10000	10000-100000	>100000

### c) Transparencia de la columna de agua. Disco de Secchi (DS)

Por su parte, la transparencia, medida como profundidad de visibilidad del disco de Secchi (media y mínimo anual en m), está también íntimamente relacionada con la biomasa algal, aunque más indirectamente, ya que otros factores como la turbidez debida a sólidos en suspensión, o los fenómenos de dispersión de la luz que se producen en aguas carbonatadas, afectan a esta variable.

Se utilizaron las clases de calidad relativas al mínimo anual de transparencia según criterios OCDE. Se utilizaron en este caso los rangos relativos al mínimo anual (tabla A3) debido a varios factores: por un lado, la transparencia en embalses es generalmente menor que en lagos; por otro lado, en verano se producen resuspensiones de sedimentos como consecuencia de los desembalses para regadío, y por último, la mayoría de los embalses muestreados son de aguas carbonatadas, con lo que la profundidad de Secchi subestimaría también la transparencia.

**Tabla A3.** Niveles de calidad según la transparencia.

Estado Trófico	Ultraoligotrófico	Oligotrófico	Mesotrófico	Eutrófico	Hipereutrófico
Disco Secchi (m)	>6	6-3	3-1,5	1,5-0,7	<0,7

### Catalogación trófica final

Se han considerado la totalidad de los índices expuestos, que se especifican en la tabla A4, estableciéndose el estado trófico global de los embalses estudiados según la metodología descrita a continuación, utilizando el valor promedio de los dos muestreos en su caso.

**Tabla A4.** Resumen de los parámetros indicadores de estado trófico.

Parámetros   Estado Trófico	Ultraoligotrófico	Oligotrófico	Mesotrófico	Eutrófico	Hipereutrófico
Concentración PT ( $\mu\text{g}$ )	0-4	4-10	10-35	35-100	>100
Disco de Secchi (m)	>6	6-3	3-1,5	1,5-0,7	<0,7
Clorofila <i>a</i> ( $\mu\text{g/L}$ )	0-1	1-2,5	2,5-8	8,0-25	>25
Densidad algal (cél./ml)	<100	100-1000	1000-10000	10000-100000	>100000

Sobre la base de esta propuesta, en la tabla A5 se incluye la catalogación de las diferentes masas de agua por parámetro. Así, para cada uno de los embalses, se asignó un valor numérico (de 1 a 5) según cada clase de estado trófico.

**Tabla A5.** Valor numérico asignado a cada clase de estado trófico.

ESTADO TRÓFICO	VALORACIÓN
Ultraoligotrófico	1
Oligotrófico	2
Mesotrófico	3
Eutrófico	4
Hipereutrófico	5

La valoración del estado trófico global final se calculó mediante la *media* de los valores anteriores, re-escalada a cinco rangos de estado trófico (es decir, el intervalo 1-5, de 4 unidades, dividido en 5 rangos de 0,8 unidades de amplitud).

## 2. ESTADO DE LA MASA DE AGUA

El **estado** de una masa de agua es el grado de alteración que presenta respecto a sus condiciones naturales, y viene determinado por el *peor valor* de su estado ecológico y químico.

- El *estado ecológico* es una expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales en relación con las condiciones de referencia (es decir, en ausencia de alteraciones). En el caso de los embalses se denomina *potencial ecológico* en lugar de estado ecológico. Se determina a partir de indicadores de calidad (biológicos y fisicoquímicos).

- El estado químico de las aguas es una expresión de la calidad de las aguas superficiales que refleja el grado de cumplimiento de las normas de calidad ambiental de las sustancias prioritarias y otros contaminantes.

## 2.1. POTENCIAL ECOLÓGICO

### 2.1.1. INDICADORES DE CALIDAD BIOLÓGICOS: FITOPLANCTON

Como consecuencia de la aprobación de la IPH (Instrucción de Planificación Hidrológica, Orden ARM/2656/2008), se ha realizado una aproximación al potencial ecológico para el elemento de calidad fitoplancton denominada *propuesta normativa*. En ella se establecen las condiciones de máximo potencial para los siguientes parámetros: clorofila a, biovolumen, Índice de Grupos Algales (IGA) y porcentaje de cianobacterias, en función de la tipología del embalse.

Se debe seguir el procedimiento descrito en el Protocolo MFIT-2013 Versión 2 para el cálculo del RCE de cada uno de los cuatro parámetros:

#### - Cálculo de Ratio de Calidad Ecológico (RCE)

##### Cálculo para clorofila a:

$$\text{RCE} = [(1/\text{Chla Observado}) / (1/\text{Chla Máximo Potencial Ecológico})]$$

##### Cálculo para biovolumen:

$$\text{RCE} = [(1/\text{biovolumen Observado}) / (1/\text{biovolumen Máximo Potencial Ecológico})]$$

##### Cálculo para el Índice de Grupos Algales (IGA):

$$\text{RCE} = [(400 - \text{IGA Observado}) / (400 - \text{IGA Máximo Potencial Ecológico})]$$

##### Cálculo para el porcentaje de cianobacterias:

$$\text{RCE} = [(100 - \% \text{ cianobacterias Observado}) / (100 - \% \text{ cianobacterias Máximo Potencial Ecológico})]$$

#### 1) Concentración de clorofila a

Del conjunto de pigmentos fotosintetizadores de las microalgas de agua dulce, la clorofila a se emplea como un indicador básico de biomasa fitoplanctónica. Todos los grupos de microalgas contienen clorofila a como pigmento principal, pudiendo llegar a

representar entre el 1 y el 2 % del peso seco total. La clasificación del potencial ecológico de acuerdo con la concentración de clorofila *a* se indica en la tabla A6.

**Tabla A6.** Clases de potencial ecológico según el RCE de la concentración de clorofila *a*.

Clase de potencial ecológico	Bueno o superior	Moderado	Deficiente	Malo
Rango <i>Tipos 1, 2 y 3</i>	> 0,211	0,210 – 0,14	0,13 – 0,07	< 0,07
Rango <i>Tipos 7, 8, 9, 10 y 11</i>	> 0,433	0,432 – 0,287	0,286 – 0,143	< 0,143
Rango <i>Tipo 12</i>	> 0,195	0,194 – 0,13	0,12 – 0,065	< 0,065
Rango <i>Tipo 13</i>	> 0,304	0,303 – 0,203	0,202 – 0,101	< 0,101
Valoración de cada clase	2	3	4	5

## 2) Biovolumen algal

El biovolumen es una medida mucho más precisa de la biomasa algal, por tener en cuenta el tamaño o volumen celular de cada especie, además del número de células. La clasificación del potencial ecológico de acuerdo al biovolumen de fitoplancton se indica en la tabla A7.

**Tabla A7.** Clases de potencial ecológico según el RCE del biovolumen algal del fitoplancton.

Clase de potencial ecológico	Bueno o superior	Moderado	Deficiente	Malo
Rango <i>Tipos 1, 2 y 3</i>	> 0,189	0,188 – 0,126	0,125 – 0,063	< 0,063
Rango <i>Tipos 7, 8, 9, 10 y 11</i>	> 0,362	0,361 – 0,24	0,23 – 0,12	< 0,12
Rango <i>Tipo 12</i>	> 0,175	0,174 – 0,117	0,116 – 0,058	< 0,058
Rango <i>Tipo 13</i>	> 0,261	0,260 – 0,174	0,173 – 0,087	< 0,087
Valoración de cada clase	2	3	4	5

## 3) Índice de grupos algales (IGA)

Se ha aplicado un índice basado en el biovolumen relativo de diferentes grupos algales del fitoplancton, denominado *IGA*, y que viene siendo utilizado por CHE desde 2010.

El índice *IGA* se expresa:

$$Iga = \frac{1 + 0.1 * Cr + Cc + 2 * (Dc + Chc) + 3 * Vc + 4 * Cia}{1 + 2 * (D + Cnc) + Chnc + Dnc}$$

Siendo,

<i>Cr</i>	<b>Criptófitos</b>	<i>Cia</i>	<b>Cianobacterias</b>
<i>Cc</i>	<b>Crisófitos coloniales</b>	<i>D</i>	<b>Dinoflageladas</b>
<i>Dc</i>	<b>Diatomeas coloniales</b>	<i>Cnc</i>	<b>Crisófitos no coloniales</b>
<i>Chc</i>	<b>Clorococales coloniales</b>	<i>Chnc</i>	<b>Clorococales no coloniales</b>
<i>Vc</i>	<b>Volvocales coloniales</b>	<i>Dnc</i>	<b>Diatomeas no coloniales</b>

En cuanto al IGA, se han considerado los rangos de calidad establecidos en la tabla A8.

**Tabla A8.** Clases de potencial ecológico según el RCE del Índice de Grupos Algales (IGA).

Clase de potencial ecológico	Bueno o superior	Moderado	Deficiente	Malo
Rango Tipos 1, 2 y 3	> 0,974	0,973 – 0,649	0,648 – 0,325	< 0,325
Rango Tipos 7, 8, 9, 10 y 11	> 0,982	0,981 – 0,655	0,654 – 0,327	< 0,327
Rango Tipo 12	> 0,929	0,928 – 0,619	0,618 – 0,31	< 0,31
Rango Tipo 13	> 0,979	0,978 – 0,653	0,652 – 0,326	< 0,326
Valoración de cada clase	2	3	4	5

#### 4) Porcentaje de cianobacterias

El aumento de la densidad relativa de cianobacterias se ha relacionado en numerosas ocasiones con procesos de eutrofización.

Para el cálculo del porcentaje de cianobacterias se ha utilizado el procedimiento descrito en el Protocolo de análisis y cálculo de métricas de fitoplancton en lagos y embalses Versión 2 (MAGRAMA, 2016). Se aplica para el cálculo la siguiente fórmula:

$$\%CIANO = \frac{BVOL_{CIA} - [BVOL_{CHR} - (BVOL_{MIC} + BVOL_{WOR})]}{BVOL_{TOT}}$$

Donde:	BVOL <sub>CIA</sub>	Biovolumen de cianobacterias totales
	BVOL <sub>CHR</sub>	Biovolumen de Chroococcales
	BVOL <sub>MIC</sub>	Biovolumen de <i>Microcystis</i>
	BVOL <sub>WOR</sub>	Biovolumen de <i>Woronichinia</i>
	BVOL <sub>TOT</sub>	Biovolumen total de fitoplancton

Los valores de cambio de clases se establecen como se muestran en la tabla A9.

**Tabla A9.** Clases de potencial ecológico según el RCE del porcentaje de cianobacterias.

Clase de potencial ecológico	Bueno o superior	Moderado	Deficiente	Malo
Rango Tipos 1, 2 y 3	> 0,908	0,907 – 0,607	0,606 – 0,303	< 0,303
Rango Tipos 7, 8, 9, 10 y 11	> 0,715	0,714 – 0,48	0,47 – 0,24	< 0,24
Rango Tipo 12	> 0,686	0,685 – 0,457	0,456 – 0,229	< 0,229
Rango Tipo 13	> 0,931	0,930 – 0,621	0,620 – 0,31	< 0,31
Valoración de cada clase	2	3	4	5

Posteriormente, es necesario llevar a cabo la *transformación de los valores de RCE obtenidos* a una escala numérica equivalente para los cuatro indicadores (RCE<sub>trans</sub>). Las ecuaciones varían en función del tipo de embalse.

Tipos 1, 2 y 3

Clorofila a	
RCE > 0,21	$RCE_{trans} = 0,5063 \times RCE + 0,4937$
RCE ≤ 0,21	$RCE_{trans} = 2,8571 \times RCE$
Biovolumen	
RCE > 0,19	$RCE_{trans} = 0,4938 \times RCE + 0,5062$
RCE ≤ 0,19	$RCE_{trans} = 3,1579 \times RCE$
% Cianobacterias	
RCE > 0,91	$RCE_{trans} = 4,4444 \times RCE - 3,4444$
RCE ≤ 0,91	$RCE_{trans} = 0,6593 \times RCE$
Índice de Grupos Algales (IGA)	
RCE > 0,9737	$RCE_{trans} = 15,234 \times RCE - 14,233$
RCE ≤ 0,9737	$RCE_{trans} = 0,6162 \times RCE$

Tipos 7, 8, 9, 10 y 11

Clorofila a	
RCE > 0,43	$RCE_{trans} = 0,7018 \times RCE + 0,2982$
RCE ≤ 0,43	$RCE_{trans} = 1,3953 \times RCE$
Biovolumen	
RCE > 0,36	$RCE_{trans} = 0,625 \times RCE + 0,375$
RCE ≤ 0,36	$RCE_{trans} = 1,6667 \times RCE$
% Cianobacterias	
RCE > 0,72	$RCE_{trans} = 1,4286 \times RCE - 0,4286$
RCE ≤ 0,72	$RCE_{trans} = 0,8333 \times RCE$
Índice de Grupos Algales (IGA)	
RCE > 0,9822	$RCE_{trans} = 22,533 \times RCE - 21,533$
RCE ≤ 0,9822	$RCE_{trans} = 0,6108 \times RCE$

Tipos 6 y 12

Clorofila a	
RCE > 0,195	$RCE_{trans} = 0,497x RCE + 0,503$
RCE ≤ 0,195	$RCE_{trans} = 3,075 x RCE$

Biovolumen	
RCE > 0,175	$RCE_{trans} = 0,4851 x RCE + 0,5149$
RCE ≤ 0,175	$RCE_{trans} = 3,419 x RCE$

% Cianobacterias	
RCE > 0,686	$RCE_{trans} = 1,2726x - 0,2726$
RCE ≤ 0,686	$RCE_{trans} = 0,875 x RCE$

Índice de Grupos Algales (IGA)	
RCE > 0,929	$RCE_{trans} = 5,6325x - 4,6325$
RCE ≤ 0,929	$RCE_{trans} = 0,6459 x RCE$

Tipo 13

Clorofila a	
RCE > 0,304	$RCE_{trans} = 0,575 x RCE + 0,425$
RCE ≤ 0,304	$RCE_{trans} = 1,9714 x RCE$

Biovolumen	
RCE > 0,261	$RCE_{trans} = 0,541x RCE + 0,459$
RCE ≤ 0,261	$RCE_{trans} = 2,3023 x RCE$

% Cianobacterias	
RCE > 0,931	$RCE_{trans} = 5,7971 x RCE - 4,7971$
RCE ≤ 0,931	$RCE_{trans} = 0,6445 x RCE$

Índice de Grupos Algales (IGA)	
RCE > 0,979	$RCE_{trans} = 18,995 x RCE - 17,995$
RCE ≤ 0,979	$RCE_{trans} = 0,6129 x RCE$

Para la combinación de los distintos indicadores representativos del elemento de calidad fitoplancton se hallará la *media* de los RCE transformados correspondientes a los parámetros “*abundancia-biomasa*” y “*composición*”. La combinación de los RCE transformados se llevará a cabo primero para los indicadores de clorofila y biovolumen, ambos representativos de la abundancia. La combinación se hará mediante las *medias* de los RCE transformados.

Posteriormente se llevará a cabo la combinación de los indicadores representativos de la composición: porcentaje de cianobacterias y el IGA. La combinación se hará mediante las *medias* de los RCE transformados. Finalmente, para la combinación de los indicadores de composición y abundancia-biomasa se hará la *media aritmética*.

El valor final de la combinación de los RCE transformados se clasificará de acuerdo a la siguiente escala de la tabla A10:

**Tabla A10.** Ratios de calidad según el índice de potencial ecológico normativo RCEtrans.

Clase de potencial ecológico	Bueno o superior	Moderado	Deficiente	Malo
<i>RCEtrans</i>	> 0,6	0,4-0,6	0,2-0,4	<0,2
Valoración de cada clase	2	3	4	5

**Tabla A11.** Valores de referencia propios del tipo ( $VR_t$ ) y límites de cambio de clase de potencial ecológico ( $B^+/M$ , Bueno o superior-Moderado;  $M/D$ , Moderado-Deficiente;  $D/M$ , Deficiente-Malo) de los indicadores de los elementos de calidad de embalses (*RD 817/2015*). Se han incluido sólo los tipos de embalses presentes en el ESTUDIO.

Tipo	Elemento	Parámetro	Indicador	$VR_t$	$B^+/M$ (RCE)	$M/D$ (RCE)	$D/M$ (RCE)
Tipo 1	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila <i>a</i> mg/m <sup>3</sup>	2,00	0,211	0,14	0,07
			Biovolumen mm <sup>3</sup> /L	0,36	0,189	0,126	0,063
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	0,10	0,974	0,649	0,325
			Porcentaje de cianobacterias	0,00	0,908	0,607	0,303
Tipo 7	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila <i>a</i> mg/m <sup>3</sup>	2,60	0,433	0,287	0,143
			Biovolumen mm <sup>3</sup> /L	0,76	0,362	0,24	0,12
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	0,61	0,982	0,655	0,327
			Porcentaje de cianobacterias	0,00	0,715	0,48	0,24
Tipo 9	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila <i>a</i> mg/m <sup>3</sup>	2,60	0,433	0,287	0,143
			Biovolumen mm <sup>3</sup> /L	0,76	0,362	0,24	0,12
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	0,61	0,982	0,655	0,327
			Porcentaje de cianobacterias	0,00	0,715	0,48	0,24
Tipo 10	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila <i>a</i> mg/m <sup>3</sup>	2,60	0,433	0,287	0,143
			Biovolumen mm <sup>3</sup> /L	0,76	0,362	0,24	0,12
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	0,61	0,982	0,655	0,327
			Porcentaje de cianobacterias	0,00	0,715	0,48	0,24
Tipo 11	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila <i>a</i> mg/m <sup>3</sup>	2,60	0,433	0,287	0,143
			Biovolumen mm <sup>3</sup> /L	0,76	0,362	0,24	0,12
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	0,61	0,982	0,655	0,327
			Porcentaje de cianobacterias	0,00	0,715	0,48	0,24
Tipo 12	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila <i>a</i> mg/m <sup>3</sup>	2,40	0,195	0,13	0,065
			Biovolumen mm <sup>3</sup> /L	0,63	0,175	0,117	0,058
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	1,50	0,929	0,619	0,31
			Porcentaje de cianobacterias	0,10	0,686	0,457	0,229
Tipo 13	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila <i>a</i> mg/m <sup>3</sup>	2,10	0,304	0,203	0,101
			Biovolumen mm <sup>3</sup> /L	0,43	0,261	0,174	0,087
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	1,10	0,979	0,653	0,326
			Porcentaje de cianobacterias	0,00	0,931	0,621	0,31

Adicional informe estado embalse de Talam 1996

Demarcación Hidrográfica del Ebro

## 2.1.2. INDICADORES DE CALIDAD FÍSICOQUÍMICOS

Todavía la normativa no ha desarrollado qué indicadores fisicoquímicos se emplean en embalses, pero por similitud con los que se recogen para lagos (Real Decreto 817/2015) se utilizan los siguientes:

### 1) Transparencia

La transparencia es un elemento válido para evaluar el grado trófico del embalse; tiene alta relación con la productividad biológica; y además tiene rangos establecidos fiables y de utilidad para el establecimiento de los límites de clase del potencial ecológico. Se ha evaluado a través de la profundidad de visión del disco de Secchi (DS), considerando su valor para la obtención de las distintas clases de potencial (tabla A12).

**Tabla A12.** Clases de potencial ecológico según la profundidad de visión del Disco de Secchi.

Clase de potencial ecológico	Muy Bueno	Bueno	Moderado
Disco de Secchi (DS, m)	> 6	6 - 3	< 3
Valoración de cada clase	1	2	3

### 2) Condiciones de oxigenación

Representa un parámetro secundario de la respuesta trófica que viene a indicar la capacidad del sistema para asimilar la materia orgánica autóctona, generada por el propio sistema a través de los productores primarios en la capa fótica, y la materia orgánica alóctona, es decir, aquella que procede de fuentes externas al sistema, como la procedente de focos de contaminación puntuales o difusos.

Se ha evaluado estimando la reserva media de oxígeno hipolimnético en el periodo de muestreo, correspondiente al periodo de estratificación. En el caso de embalses no estratificados se consideró la media de oxígeno en toda la columna de agua. Las clases consideradas han sido las correspondientes a la concentración de oxígeno en la columna de agua; parámetro vital para la vida piscícola. En la tabla A13 se resumen los límites establecidos.

**Tabla A13.** Clases de potencial ecológico según la concentración de oxígeno disuelto en el hipolimnion o en toda la columna de agua, cuando el embalse no está estratificado.

Clase de potencial ecológico	Muy Bueno	Bueno	Moderado
Concentración hipolimnética (mg/L O <sub>2</sub> )	> 8	8 - 6	< 6
Valoración de cada clase	1	2	3

### 3) Concentración de nutrientes

En este caso se ha seleccionado el fósforo total (PT), ya que su presencia a determinadas concentraciones en un embalse acarrea procesos de eutrofización, pues en la mayoría de los casos es el principal elemento limitante para el crecimiento de las algas.

Se ha empleado el resultado obtenido en la muestra integrada, considerando los criterios de la OCDE especificados en la tabla A14 (OCDE, 1982) adaptado a los intervalos de calidad del RD 817/2015.

**Tabla A14.** Clases de potencial ecológico según la concentración de fósforo total.

Clase de potencial ecológico	Muy Bueno	Bueno	Moderado
Concentración de PT ( $\mu\text{g P/L}$ )	0 - 4	4 -10	> 10
Valoración de cada clase	1	2	3

Si se toman varios datos anuales, se hace la *mediana* de los valores anuales.

Posteriormente se elige el *peor valor* de los tres indicadores (transparencia, condiciones de oxigenación y fósforo total).

### 4) Sustancias preferentes y contaminantes específicos de cuenca

Dentro de los indicadores fisicoquímicos también se tienen en cuenta las **sustancias preferentes y contaminantes específicos de cuenca**. El valor medio de los datos anuales se revisa para ver si *cumple o no con la Norma de Calidad Ambiental (NCA) del Anexo V del RD 817/2015*. Si *incumple* supone asignarle para los indicadores fisicoquímicos la categoría de *moderado*.

**Tabla A15.** Clases de potencial ecológico para sustancias preferentes y contaminantes específicos de cuenca.

Clase de potencial ecológico	Muy Bueno	Moderado
Sustancias preferentes y contaminantes específicos de cuenca	Cumple NCA	No cumple NCA
Valoración de cada clase	2	3

El potencial ecológico resulta del *peor valor* entre los indicadores biológicos y fisicoquímicos.

**Tabla A16.** Combinación de los indicadores.

Indicador Biológico	Indicador Físicoquímico	Potencial Ecológico
Bueno o superior	Muy bueno	Bueno o superior
Bueno o superior	Bueno	Bueno o superior
Bueno o superior	Moderado	Moderado
Moderado	Indistinto	Moderado
Deficiente		Deficiente
Malo		Malo

## 2.2. ESTADO QUÍMICO

El estado químico es “*no bueno*” cuando hay algún incumplimiento de la Norma de Calidad Ambiental, bien sea como media anual (NCA\_MA), como máximo admisible (NCA\_CMA) o en la biota (NCA\_biota) para las **sustancias prioritarias y otros contaminantes**. Las NCA se recogen en el *Anexo IV del RD 817/2015*.

**Tabla A17.** Clases de estado químico para sustancias prioritarias y otros contaminantes.

Clase de estado químico	Bueno	No alcanza el buen estado
Sustancias prioritarias y otros contaminantes	Cumple NCA	No cumple NCA
Valoración de cada clase	2	3

## 2.3. ESTADO

El estado de la masa de agua es el *peor valor* entre su potencial ecológico y su estado químico.

**Tabla A18.** Determinación del estado.

Estado	Estado Químico	
Potencial Ecológico	Bueno	No alcanza el buen estado
Bueno o superior	Bueno	Inferior a bueno
Moderado	Inferior a bueno	
Deficiente		
Malo		

## DIAGNÓSTICO DEL ESTADO TRÓFICO DEL EMBALSE DE TALARN

Se han considerado los indicadores especificados en la tabla A19 para los valores medidos en el embalse, estableciéndose el estado trófico global del embalse según la metodología descrita.

**Tabla A19.** Parámetros indicadores y rangos de estado trófico.

Parámetros   Estado Trófico	Ultraoligotrófico	Oligotrófico	Mesotrófico	Eutrófico	Hipereutrófico
Concentración P ( $\mu\text{g P /L}$ )	0-4	4-10	10-35	35-100	>100
Disco de Secchi (m)	>6	6-3	3-1,5	1,5-0,7	<0,7
Clorofila <i>a</i> ( $\mu\text{g/L}$ )	0-1	1-2,5	2,5-8	8,0-25	>25
Densidad algal (cél./ml)	<100	100-1000	1000-10000	10000-100000	>100000
<b>VALOR PROMEDIO</b>	<b>&lt; 1,8</b>	<b>1,8 – 2,6</b>	<b>2,6 – 3,4</b>	<b>3,4 – 4,2</b>	<b>&gt; 4,2</b>

En la tabla A20 se incluye el estado trófico indicado por cada uno de los parámetros, así como la catalogación de la masa de agua según la valoración de este estado trófico final para cada campaña de muestreo.

**Tabla A20.** Diagnóstico del estado trófico del embalse de Talarn.

INDICADOR	VALOR	ESTADO TRÓFICO
CLOROFILA <i>a</i>	0,20	Ultraoligotrófico
DISCO SECCHI	4,76	Oligotrófico
<b>ESTADO TRÓFICO FINAL</b>	<b>1,50</b>	<b>ULTRAOLIGOTRÓFICO</b>

Atendiendo a los criterios seleccionados, la concentración de clorofila *a* ha clasificado el embalse como ultraoligotrófico y la transparencia como oligotrófico. Combinando todos los indicadores, el estado trófico final para el embalse de Talarn ha resultado ser **ULTRAOLIGOTRÓFICO**.

## DIAGNÓSTICO DEL ESTADO FINAL DEL EMBALSE DE TALARN

En la mayoría de los casos en lugar del estado de la masa, sólo se puede establecer el potencial ecológico (además sin tener en cuenta la presencia de sustancias preferentes y contaminantes específicos de cuenca, para los indicadores fisicoquímicos). Tampoco se han estudiado las sustancias prioritarias y otros contaminantes que permitan determinar el estado químico, por eso se diagnostica la masa con el **potencial ecológico**.

Se han considerado los indicadores, los valores de referencia y los límites de clase B+/M (Bueno o superior/Moderado), M/D (Moderado/Deficiente) y D/M (Deficiente/Malo), así como sus ratios de calidad ecológica (RCE), especificados en las tablas A21 y A22.

**Tabla A21.** Parámetros, rangos del RCE y valores para la determinación del potencial ecológico normativo.

			RANGOS DEL RCE				
Indicador	Elementos	Parámetros	Bueno o superior	Moderado	Deficiente	Malo	
Biológico	Fitoplancton	Clorofila a (µg/L)	≥ 0,433	0,432 – 0,287	0,286 – 0,143	< 0,143	
		Biovolumen algal (mm <sup>3</sup> /L)	≥ 0,362	0,361 – 0,24	0,23 – 0,12	< 0,12	
		Índice de Catalán (IGA)	≥ 0,982	0,981 – 0,655	0,654 – 0,327	< 0,327	
		Porcentaje de cianobacterias	≥ 0,715	0,714 – 0,48	0,47 – 0,24	< 0,24	
			<b>Bueno o superior</b>	<b>Moderado</b>	<b>Deficiente</b>	<b>Malo</b>	
<b>INDICADOR BIOLÓGICO</b>			<b>&gt; 0,6</b>	<b>0,4-0,6</b>	<b>0,2-0,4</b>	<b>&lt; 0,2</b>	
			RANGOS DE VALORES				
Indicador	Elementos	Parámetros	Muy bueno	Bueno	Moderado	Deficiente	Malo
Fisicoquímico	Transparencia	Disco de Secchi (m)	>6	3-6	1,5 -3	0,7 -1,5	<0,7
	Oxigenación	O <sub>2</sub> hipolimnética (mg O <sub>2</sub> /L)	>8	8-6	6-4	4-2	<2
	Nutrientes	Concentración de PT (µg P/L)	0-4	4-10	10-35	35-100	>100
			<b>Muy bueno</b>	<b>Bueno</b>	<b>Moderado</b>		
<b>INDICADOR FISICOQUÍMICO</b>			<b>&lt; 1,6</b>	<b>1,6 – 2,4</b>	<b>&gt; 2,4</b>		

La combinación de los dos indicadores, fisicoquímico y biológico, para la obtención del potencial ecológico normativo sigue el esquema de decisiones indicado en la tabla A22.

**Tabla A22.** Combinación de los indicadores.

Indicador Biológico	Indicador Fisicoquímico	Potencial Ecológico (PE)
Bueno o superior	Muy bueno	Bueno o superior
Bueno o superior	Bueno	Bueno o superior
Bueno o superior	Moderado	Moderado
Moderado	Indistinto	Moderado
Deficiente		Deficiente
Malo		Malo

En la tabla A23 se incluye el potencial indicado por cada uno de los parámetros, así como la catalogación de la masa de agua según el potencial ecológico, tras pasar el filtro del indicador fisicoquímico.

**Tabla A23.** Diagnóstico del potencial ecológico del embalse de Talam.

Indicador	Elementos	Parámetro	Indicador	Valor	RCE	RCET	PE
Biológico	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila a (µg/L)	0,20	13,00	9,42	Bueno o superior
<b>INDICADOR BIOLÓGICO</b>				<b>2</b>		<b>BUENO O SUPERIOR</b>	
Indicador	Elementos	Indicador	Valor	PE			
Fisicoquímico	Transparencia	Disco de Secchi (m)	4,96	Bueno			
<b>INDICADOR FISICOQUÍMICO</b>			<b>2</b>	<b>BUENO</b>			
<b>POTENCIAL ECOLÓGICO</b>			<b>BUENO O SUPERIOR</b>				
<b>ESTADO FINAL</b>			<b>BUENO</b>				

De acuerdo con los resultados obtenidos, el Estado Final del embalse de Talam para el año 1996 es de nivel 2, **BUENO**.