



INFORME FINAL DEL EMBALSE DE LANUZA
AÑO 2008



UTE DBO5, SL-ICA, SL-ENTECSA
C/MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 2 Puerta 8
28460 LOS MOLINOS (MADRID)
CIF: G-84535319

CONSULTOR:
UTE RED BIOLÓGICA EBRO

Oficinas UTE Madrid: c/ Miguel Menéndez Boneta 2-4, puerta 8
28460 Los Molinos, Madrid TF y FAX 91 855 00 29 E-mail: consultoria@ica1.e.telefonica.net

ENERO 2009

ÍNDICE

	Página
<u>1. INTRODUCCIÓN</u>	1
<u>2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EMBALSE Y DE LA CUENCA VERTIENTE</u>	2
2.1. Ámbito geológico y geográfico	2
2.2. Características morfométricas e hidrológicas	2
2.3. Usos del agua	4
2.4. Registro de zonas protegidas	4
<u>3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS</u>	5
<u>4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL</u>	6
4.1. Características fisicoquímicas de las aguas	6
4.2. Hidroquímica del embalse	8
4.3. Fitoplancton y concentración de clorofila.	9
4.4. Zooplancton	10
<u>5. DIAGNÓSTICO DEL GRADO TRÓFICO</u>	12
<u>6. DIAGNOSTICO DEL POTENCIAL ECOLÓGICO</u>	13

ANEXO I. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge los resultados de los trabajos realizados en el embalse de Lanuza durante los muestreos de 2008 y la interpretación de los mismos, a efectos de proporcionar una referencia que facilite la consulta y explotación de la información obtenida.

En general, se recurre a presentaciones gráficas y sintéticas de la información, acompañadas de un texto conciso, lo que permitirá una consulta ágil y rápida del documento.

En el **Anexo I** se presenta un reportaje fotográfico que refleja el estado del embalse durante el periodo estudiado (verano 2008, correspondiente al año hidrológico 2007-2008).

En apartados sucesivos se comentan los siguientes aspectos:

- Resultados del estudio en el embalse (FASE DE CARACTERIZACIÓN) de todos los aspectos tratados (hidrológicos, fisicoquímicos y biológicos), que culminan en el diagnóstico del grado trófico.
- Clasificación del "Potencial Ecológico", tras la aplicación de los indicadores biológicos y fisicoquímicos propuestos en la Directiva Marco del Agua.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EMBALSE Y DE LA CUENCA VERTIENTE

2.1. Ámbito geológico y geográfico

La cuenca vertiente al embalse de Lanuza se sitúa en los Pirineos Centrales, en el límite con Francia, ocupando la parte norte de la provincia de Huesca, situado dentro del término municipal de Sallent de Gállego. Regula las aguas del río Gállego.

El embalse de Lanuza, en términos geológicos, se encuentra situado sobre materiales del Paleozoico como son las pizarras ampelíticas. Además, se encuentran depósitos aluviales del Cuaternario. En la cuenca predominan los materiales hercínicos, los depósitos cuaternarios de la cabecera del río Gállego y los batolitos granodioríticos del macizo de Panticosa.

2.2. Características morfométricas e hidrológicas

Se trata de un embalse de pequeñas dimensiones de geometría alargada y regular.

La cuenca vertiente al embalse de Lanuza tiene una superficie total de 11716,31 ha.

El embalse tiene una capacidad total de 16,86 hm³, que coincide con la capacidad útil. Caracterizado por una profundidad media de 17,5 m, mientras que la profundidad máxima alcanza los 69 m.

En el **Cuadro 1** se presentan las características morfométricas del embalse


CUADRO 1
CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DEL EMBALSE DE LANUZA

Superficie de la cuenca	116 km ²
Capacidad total N.M.N.	16,86 hm ³
Capacidad útil	16,86 hm ³
Aportación media anual	209 hm ³
Superficie inundada	114 ha
Cota máximo embalse normal	1275,50 msnm

Se trata de un embalse monomítico, ubicado en un zona fría de geología silícea. En el periodo estival la termoclina se sitúa a 32 metros de profundidad y el límite inferior de la capa fótica se encuentra alrededor de los 13,75 metros de profundidad.

En la **Figura 1** se presentan los valores semanales del volumen embalsado correspondientes al año hidrológico 2007-2008.

Figura 1
VOLUMEN EMBALSADO (%) DURANTE EL AÑO HIDROLÓGICO 2007-2008



2.3. Usos del agua

Las aguas del embalse se destinan principalmente al aprovechamiento hidroeléctrico y a los regadíos. También está permitida la navegación (sin restricciones para remo y vela, no es apto para motor) en este embalse.

2.4. Registro de zonas protegidas

El embalse de Lanuza no forma parte del Registro de Zonas Protegidas elaborado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, en contestación al artículo 6 de la Directiva Marco del Agua. No obstante, destacamos que sus orillas limitan con los LICs de Foz Escarrilla-Cucuraza (ES2410031) y Monte Pacino (ES2410010).

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Para acometer la caracterización del embalse se ha ubicado una estación de muestreo en las inmediaciones de la presa.

Se ha realizado una campaña de muestreo el 8 de Julio de 2008. En esa fecha hay estratificación térmica en el embalse.




4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4.1. Características fisicoquímicas de las aguas

De los resultados obtenidos se desprenden las siguientes apreciaciones:

- La temperatura del agua oscila entre los 8,2 °C – en el fondo- y los 15,2 °C -máximo registrado en superficie-. En el momento del muestreo (Julio 2008) la termoclina se sitúa a los 32 metros de profundidad.
- El pH del agua en la superficie es 6,23. En el fondo del embalse el valor del pH es de 4,25.
- La transparencia del agua registrada en la lectura de disco de Secchi es de 5,5 m, lo que supone una profundidad de la capa fótica en torno a 13,75 metros.
- Las condiciones de oxigenación de la columna de agua en el epilimnion alcanzan en el muestreo una concentración media de 10,36 mg/L. En el hipolimnion la concentración media alcanza 10,77 mg/L. No se han detectado condiciones anóxicas (<2 mg O₂/L).
- La conductividad del agua es de 138 µS/cm en la superficie y de 166 µS/cm en el fondo donde se registra el máximo valor.

GRÁFICO 1
PERFILES FÍSICO-QUÍMICOS DEL EMBALSE DE LANUZA



4.2. Hidroquímica del embalse

De los resultados obtenidos se desprenden las siguientes apreciaciones:

- La concentración de fósforo total es de 32,7 $\mu\text{g P /L}$.
- La concentración de nitrógeno total (N) se sitúa en 0,38 mg N /L.
- La concentración de nitrógeno inorgánico oxidado (nitrato + nitrito) tomó un valor de 0,28 mg N /L..
- La concentración de amonio resultó inferior al límite de detección (0,1 mg/L NH_4)
- La concentración de sílice en la muestra es de 1,6 mg SiO_2/L .

4.3. Fitoplancton y concentración de clorofila.

En el análisis realizado se han identificado un total de 40 especies, distribuidas en los siguientes grupos taxonómicos:

- 13 Bacillariophyceae
- 9 Chrysophyceae
- 8 Chlorophyta
- 6 Chryptophyta
- 3 Dynophyta
- 1 Euglenophyta

La composición y estructura de la comunidad, en el periodo estival de 2008, está caracterizada por el criptófito *Chroomonas acuta* (Utem) con un 13% de la densidad total de la muestra, le sigue el clorófito *Sphaerocstis planctonica* (Kors) Bourr (12%) y otro criptófito *Cryptomonas ovata* (Ehrbg) (9,5%). Los dinófitos *Gymnodinium fuscum* (Levand) son los que mayor biovolumen ocupan, con un 36% del total en la muestra tomada.

El grupo con mayor diversidad de especies son las diatomeas (13) y los euglenófitos el menos representado con una única especie.

La concentración de clorofila durante el muestreo es de 1,78 µg/L.

4.4. Zooplancton

En el análisis de zooplancton de las muestras del embalse de Lanuza se han identificado un total de 10 especies, distribuidas en los siguientes grupos taxonómicos:

- 6 Rotifera
- 3 Copepoda
- 1 Cladocera

La estructura y composición de la comunidad de zooplancton se resume en el siguiente cuadro (**Cuadro 2**).

CUADRO 2
 ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE ZOOPLANCTON

EMBALSE DE LANUZA		FECHA DE MUESTREO	08/07/2008
		CODIGO PUNTO DE MUESTREO	
PARAMETRO	UNIDAD	LAN	
PROFUNDIDAD	m	13,00	
DENSIDAD TOTAL	individuos/L	35,86	
BIOMASA TOTAL	µg/L	22,83	
CLASE PREDOMINANTE (DENSIDAD)		ROTIFERA	
	individuos/L	35,20	
ESPECIE PREDOMINANTE (DENSIDAD)		<i>Asplanchna priodonta</i>	
	individuos/L	26,08	
CLASE PREDOMINANTE ZOOPLANCTON (BIOMASA)		ROTIFERA	
	µg/L	21,22	
ESPECIE PREDOMINANTE ZOOPLANCTON (BIOMASA)		<i>Asplanchna priodonta</i>	
	µg/L	19,56	

La composición y estructura de la comunidad, en el periodo estival de 2008, está caracterizada por el rotífero *Asplanchna priodonta*, con un 72,72% de la densidad total y un 85,67% de la biomasa total.

En cuanto a diversidad de especies, el grupo de rotíferos es el mejor representado, con 6 especies.

5. DIAGNÓSTICO DEL GRADO TRÓFICO

Se han considerado los indicadores especificados en el **Cuadro 3** para los valores medios en el embalse, estableciéndose el estado trófico global del embalse según la metodología descrita en la sección 5 de la MEMORIA DEL ESTUDIO (pág. 82).

CUADRO 3
 PARÁMETROS INDICADORES Y RANGOS DE ESTADO TRÓFICO

Parámetros Estado Trófico	Ultraoligotrófico	Oligotrófico	Mesotrófico	Eutrófico	Hipereutrófico
Concentración P ($\mu\text{g P /L}$)	0-4	4-10	10-35	35-100	>100
Disco de Secchi (m)	>6	6-3	3-1,5	1,5-0,7	<0,7
Clorofila a ($\mu\text{g/L}$) en	0-1	1-2,5	2,5-8	8,0-25	>25
Densidad algal (cel/ml)	<100	100-1000	1000-10000	10000-100000	>100000

En el **Cuadro 4** se incluye el estado trófico indicado por cada uno de los parámetros, así como la catalogación de la masa de agua según la valoración de este estado trófico final.

CUADRO 4
 DIAGNOSTICO DEL ESTADO TROFICO DEL EMBALSE DE LANUZA.

INDICADOR	VALOR	ESTADO TRÓFICO
P TOTAL	32,70	Mesotrófico
CLOROFILA A	1,78	Oligotrófico
DISCO SECCHI	5,50	Oligotrófico
DENSIDAD ALGAL	408,48	Oligotrófico
ESTADO TROFICO FINAL	3,75	OLIGOTRÓFICO

Atendiendo a los criterios seleccionados, el fósforo total (PT) indica un estado de mesotrofia. Mientras que los resultados obtenidos según la transparencia (DS), la concentración de clorofila a, y la densidad algal clasifican al embalse como oligotrófico. El estado trófico final para el embalse de LANUZA es **OLIGOTRÓFICO**.

6. DIAGNOSTICO DEL POTENCIAL ECOLÓGICO

a) Aproximación experimental (*PEexp*)

Se han considerado los indicadores especificados en el **Cuadro 5**, estableciéndose el potencial ecológico del embalse según la metodología descrita en la sección 6.3, apartado a) de la MEMORIA DEL ESTUDIO (pág. 131).

CUADRO 5

PARÁMETROS Y RANGOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL ECOLÓGICO

Indicador	Elementos	Parámetros	Óptimo	Bueno	Moderado	Deficiente	Malo
Biológico	Fitoplancton	Densidad algal (cel/ml)	<100	100-10 ³	10 ³ -10 ⁴	10 ⁴ -10 ⁵	>10 ⁵
		Biomasa algal, Clorofila a (µg/L)	0-1	1-2,5	2,5-8	8,0-25	>25
		Biovolumen algal (mm ³ /L)	<0,1	0,1-0,5	0,5-2	2-8	>8
		Índice fitoplanctonique I _{pl}	0-20	20-40	40-60	60-80	>80
		<i>Phytoplankton Assemblage Index (Q)</i>	>4	3-4	2-3	1-2	<1
INDICADOR BIOLÓGICO (1)			4, 2 -5	3, 4 -4, 2	2,6-3,4	1, 8 -2, 6	1-1, 8
Fisicoquímico	Transparencia	Profundidad Disco de Secchi (m)	>6	3-6	1, 5 -3	0, 7 -1,5	<0, 7
	Oxigenación	Concentración O ₂ (mg O ₂ /L)	>8	8-6	6-4	4-2	<2
	Nutrientes	Concentración de PT (µg P /L)	0-4	4-10	10-35	35-100	>100
	Elemento combinado	TSI	<20	20-40	40-60	60-80	>80
INDICADOR FISICOQUÍMICO (2)			4-5	3-3, 9 9	<3		

(1) La valoración del indicador biológico se obtiene asignando la calificación del elemento fitoplancton.

(2) La valoración del indicador fisicoquímico se obtiene realizando la media de las puntuaciones obtenidas para los distintos elementos. Si la media de los 4 elementos es igual o superior a 4, se considera que se cumplen las condiciones fisicoquímicas propias del máximo potencial ecológico (MPE). Si se alcanzan o superan los 3 puntos, se considera que las condiciones fisicoquímicas aseguran el funcionamiento del ecosistema

(AS.FUN). Si no se alcanzan los 3 puntos, el estado fisicoquímico no asegura el funcionamiento del ecosistema (NO AS.FUN).

En el **Cuadro 6** se incluye el potencial indicado por cada uno de los parámetros e indicadores, así como la catalogación de la masa de agua según el potencial ecológico final.

CUADRO 6
 DIAGNOSTICO DEL POTENCIAL ECOLÓGICO DEL EMBALSE DE LANUZA.

Indicador	Elementos	Parámetros	Valor	Potencial
Biológico	Fitoplancton	Densidad algal(ce/ml)	408,48	BUENO
		Clorofila a (µg/L)	1,78	BUENO
		Biovolumen algal(mm ³ /L)	0,31	BUENO
		<i>Indice Planctonique (I_{PL})</i>	38,00	BUENO
		<i>Phytoplankton Assemblage Index (Q)</i>	2,66	MODERADO
INDICADOR BIOLÓGICO			3,80	BUENO
Fisicoquímico	Transparencia	Disco de Secchi(m)	5,50	BUENO
	Oxigenación	O ₂ hipolimnética (mg/LO ₂)	10,77	OPTIMO
	Nutrientes	Concentración de P(µg/LP)	32,70	MODERADO
	Elemento combinado	TSI	37,20	BUENO
INDICADOR FISICOQUÍMICO			4,00	MPE
POTENCIAL ECOLÓGICO			BUENO	

b) Aproximación normativa (*PE_{norm}*)

Se han considerado los indicadores, los valores de referencia y los límites de clase bueno-moderado (B/M), así como sus ratios de calidad ecológica (RCE), especificados en el **Cuadro 7**, estableciéndose el potencial ecológico del embalse según la metodología descrita en la sección 6.3, apartado b) de la MEMORIA DEL ESTUDIO (pág. 137).

CUADRO 7

VALORES DE REFERENCIA PROPIOS DEL TIPO (VR_t) Y LÍMITES DE CAMBIO DE CLASE DE POTENCIAL ECOLÓGICO (B/M, BUENO-MODERADO) DE LOS INDICADORES DE LOS ELEMENTOS DE CALIDAD DE EMBALSES (*ORDEN ARM 2656*).

Tipo	Elemento	Parámetro	Indicador	VR_t	B/M	B/M (RCE)
Tipo 1	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila a mg/m^3	2	9,5	0,21
			Biovolumen mm^3/L	0,36	1,9	0,19
		Composición	Índice de Catalan (IGA)	0,1	10,6	0,97
			Porcentaje de cianobacterias	0	9,2	0,91
Tipo 7	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila a mg/m^3	2,6	6	0,43
			Biovolumen mm^3/L	0,76	2,1	0,36
		Composición	Índice de Catalan (IGA)	0,61	7,7	0,98
			Porcentaje de cianobacterias	0	28,5	0,72
Tipo 9	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila a mg/m^3	2,6	6	0,43
			Biovolumen mm^3/L	0,76	2,1	0,36
		Composición	Índice de Catalan (IGA)	0,61	7,7	0,98
			Porcentaje de cianobacterias	0	28,5	0,72
Tipo 10	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila a mg/m^3	2,6	6	0,43
			Biovolumen mm^3/L	0,76	2,1	0,36
		Composición	Índice de Catalan (IGA)	0,61	7,7	0,98
			Porcentaje de cianobacterias	0	28,5	0,72
Tipo 11	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila a mg/m^3	2,6	6	0,43
			Biovolumen mm^3/L	0,76	2,1	0,36
		Composición	Índice de Catalan (IGA)	0,61	7,7	0,98
			Porcentaje de cianobacterias	0	28,5	0,72

En el **Cuadro 8** se incluye el potencial indicado por cada uno de los parámetros, así como la catalogación de la masa de agua según el potencial ecológico final (*PE_{norm}*) tras pasar el filtro del estado fisicoquímico.

CUADRO 8

DIAGNOSTICO DEL POTENCIAL ECOLÓGICO (*PE_{norm}*) DEL EMBALSE DE LANUZA.

Indicador	Elementos	Parámetros	Valor RCE	<i>PE_{norm}</i>
Biológico	Fitoplancton	Clorofila a (µg/L)	1,12	Óptimo
		Biovolumen algal (mm ³ /L)	1,15	Óptimo
		Índice de Catalán (IGA)	1,00	Bueno
		Porcentaje de cianobacterias (Q)	1,00	Bueno
INDICADOR BIOLÓGICO			2,5	BUENO
Fisicoquímico	Transparencia	Disco de Secchi(m)	4,50	BUENO
	Oxigenación	O ₂ hipolimnética (mg O ₂ /L)	0,27	MALO
	Nutrientes	Concentración de P(µg P/L)	10,2	MODERADO
	Elemento combinado	TSI	37,31	BUENO
INDICADOR FISICOQUÍMICO			3,00	AS-FUN
POTENCIAL ECOLÓGICO <i>PE_{norm}</i>			BUENO	

ANEXO I
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
